




Воздействия ледяных образований на берега и дно Байдарацкой губы Карского моря. Карта-схема.

Условные обозначения: 1 – навалы и надвиги морских льдов на низкие берега, пляжи и осушки; 2 – область развития устойчивого припая «на дне» с участками смерзания с грунтом в приурезовой зоне, на подводных вдольбереговых валах и в мелководных заливах. Ледяные образования – гряды торосов и стамухи приурочены к подводным береговым валам. Экзарация дна ограничена слабой подвижностью припая. Сохранность ледово-экзарационных форм низкая; 3 – область развития неустойчивого припая «на плаву». Вдольбереговые гряды торосов, «ледяные плотины» и отдельные стамухи соответствуют периодам напорного сжатия и торошения в прикромочной зоне формирующегося припая, отражая стадии его проградации. Интенсивность экзарации дна – средняя. Сохранность ледово-экзарационных форм низкая; 4 – область торошений в прикромочной зоне припая. Интенсивная экзарация дна «ледяными» плотинами в результате напорных движений ледяного покрова в сторону суши и дрейфующими вдоль кромки припая ледяными торосистыми образованиями. Сохранность ледово-экзарационных форм средняя; 5 – область дрейфующих льдов. Наиболее интенсивная экзарация киями торосистых образований, вмержших ледяные поля, дрейфующие под действием приливных течений. Сохранность ледово-экзарационных форм высокая; 6 – область дрейфующих льдов. Крупнобраздчатая экзарация киями тяжелых глубоководных торосистых образований, вмержших в ледяные поля, «несяками» и обломками айсбергов, дрейфующих под действием приливных течений. Сохранность ледово-экзарационных форм высокая; 7 – область дрейфующих льдов за пределами зоны экзарационного воздействия морских льдов. Кили ледяных образований в большинстве своем не достигают дна. Вероятность актов пропажки дна крайне низкая.